

mas, também, em fecha-lo para atrair o uretér longe das veias, tão completamente, para, assim, remover toda possibilidade de obstrução. O resultado obtido neste caso foi completamente satisfatório. O mesmo succedeu á um outro caso. Foi feita a drenagem do saco para mais de um mês, por meio duma sonda que passava pelo meato peniano. Terminou numa admiravel restauração do rim, com a função praticamente normal, tornando possivel a sua salvação, dando o processo conservador plastico do bacinete excelentes resultados. K.

Osteomielite de vertebra

Joseph A. Lazarus — New York

Com uma comunicação de dous casos simulando abcessos perinefreticos.

A osteomielite da coluna vertebral é uma molestia rara. Quando está assestada na porção inferior da coluna vertebral e na lombar, póde simular molestias dos rins ou dos tecidos perirenais. O exame radiologico da coluna auxilia pouco ou nada no diagnostico. A possibilidade desta molestia póde ser lembrada nos casos suspeitos de abcesso perinefretico. No caso de nada de patologico ser encontrado ao redor do rim, a operação não será determinada sem um exame da coluna. O processo operatorio consiste na evacuação do pús e na curetagem branda do osso. K.

Cicatrização das ulceras cronicas duodenais

Theodore L. Bliss — Rochester, Minn.

E' apresentado o aspéto microscopico de algumas fâses que ocorrem na cicatrização da ulcera cronica duodenal. São ilustrados em secções miseroscopicas os varios fátores que auxiliam a cicatrização da ulcera cronica duodenal, com exceção da formação do botão de granulação, descrito por Mann. São ilustrados os criterios microscopicos da escár da ulcera cronica duodenal, como descritos por Stewart. A parte que as glandulas de Lieberkühn representam na cura é ilustrada em secções microscopicas. K.

Rútura traumatica do estomago

Charles R. Faucher e M. G. Barmore — Oakland, Cal.

Comunicação de dous casos.

A rúture de estomago não é comum comparada á rúture das outras visceras. Seus sintomas são, antes, constantes: vomito e hematemése ocorrem em muitos casos, além do chóque e dum abdome agudo, com um caráter terrífico e dramatico. Os pacientes estão, frequentemente, moribundos antes do estado ser diagnosticado. Uma vez o caso diagnosticado a laparotomia é o unico tratamento; o restabelecimento estan-